

 Fiche à joindre au dossier du patient (scanner si dossier informatisé) **ET** à transmettre lors de **TOUT TRANSFERT** au service receveur en complément de la fiche de liaison + **si BHRé : appel téléphonique**

<p style="text-align: center;">Etiquette du patient ou</p> <p>Nom.....</p> <p>Prénom.....</p> <p>Date de naissance.....</p>	<p>Service.....</p> <p>Médecin référent.....</p> <p>Téléphone.....</p>								
<p>Agent infectieux ou maladie, identifiés ou suspectés.....</p> <p>Date prélèvement ou diagnostic.....</p> <p>Site Infecté <input type="checkbox"/> Colonisé <input type="checkbox"/></p> <p>Signes cliniques favorisant la transmission croisée</p> <p>Toux <input type="checkbox"/> Vomissement <input type="checkbox"/> Diarrhée <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>.....</p> <p>Prescription des précautions complémentaires (PC)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">PC de type</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Contact</td> <td>C <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Gouttelette</td> <td>G <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Air</td> <td>A <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Date de mise en place.....</p> <p>Date d'arrêt de l'isolement si prévisible.....</p> </div>		PC de type		• Contact	C <input type="checkbox"/>	• Gouttelette	G <input type="checkbox"/>	• Air	A <input type="checkbox"/>
PC de type									
• Contact	C <input type="checkbox"/>								
• Gouttelette	G <input type="checkbox"/>								
• Air	A <input type="checkbox"/>								

Quelles mesures ?

Précautions complémentaires en complément des précautions "standard" (PS)* *cf rappel ci-dessous*

- **Renforcement de l'hygiène des mains** : priorité aux solutions hydro alcooliques
- Signalisation et information de tous les acteurs
- **Chambre individuelle à privilégier** ou regroupement des cas
- **Déchets et linge** : circuits et procédures habituelles sauf protocole de l'établissement
- **Vaisselle** : circuits et procédures habituelles

Contact	Gouttelette	Air
<ul style="list-style-type: none"> • Tablier plastique : lors d'un soin direct • Matériel réutilisable : dédié si possible • Gants : comme PS, à renforcer pour certains micro-organismes tels que Gale, CD (cf. verso) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masque chirurgical - Personnel : à l'entrée de la chambre (FFP2 si geste à risque) - - Patient : en dehors de sa chambre 	<ul style="list-style-type: none"> • Chambre seule obligatoire, porte fermée - Masque FFP2 avant d'entrer dans la chambre et à retirer une fois sorti - Masque chirurgical : pour le patient en dehors de sa chambre

Rappel Précautions « Standard » : à prendre par tout soignant pour tout patient, quelque soit son statut infectieux

- Hygiène des mains
- **Gants uniquement si contact** avec du sang, liquides biologiques, muqueuses et peau lésée
- **Masque/lunettes** : si risque de projection de sang ou liquides biologiques **ET** **masque** pour le **patient**, en dehors de la chambre, si toux
- **Protection de la tenue** : **soin souillant, mouillant et exposant au sang ou liquides biologiques**

Mesures spécifiques

- **BHRe** (Bactéries Hautement Résistantes Emergentes) telles que les **Entérobactéries Productrices de Carbapénémases (EPC)** et **Entérocoques Résistants aux Glycopeptides (ERG)**
 - contacter l'**EOH** dès suspicion
 - chambre individuelle
 - application des PCC avec un très haut niveau de respect
 - Sectorisation ou personnels dédiés en cas d'épidémie
 - Dépistage des contacts
 - Dès transfert : info par téléphone au service accueillant.
- **Diarrhées à Clostridium Difficile Toxinogène** :
 - Chambre individuelle, port de gants systématique, lavage simple des mains au savon doux suivi d'une friction sur mains sèches, protection tenue manches longues, ensemble des déchets en DASRI.
 - désinfection quotidienne du sol et des surfaces de la chambre du patient et matériel à UU : soit à l'eau de javel (solution à 2,6% diluée au 1/5ème) et après déterSION et rinçage, soit avec un produit sporicide selon protocole d'établissement
- **Gale** :
 - Chambre individuelle, port de gants systématique, lavage simple des mains au savon doux suivi d'une friction sur mains sèches, protection tenue manches longues, traitement du linge (respecter 60°C ou traitement acaricide de contact)

PRINCIPALES INDICATIONS

Précautions Standard uniquement

Hépatite B et C, Légionellose, Méningite virale, VIH...

Contact

Staphylocoque **Aureus Résistant à la Méricilline (SARM)**
Acinetobacter **Baumanii Résistant à l'Imipénème (ABRI)**
Acinetobacter ne restant sensible qu'à l'imipénème
Entérobactéries productrices de **BêtaLactamases à Spectre Etendu (EBLSE)**
Pseudomonas aeruginosa résistant à l'imipénème associé à d'autres résistances
Entérobactérie Productrice de **Carbapénémase (EPC)**
Entérocoques **Résistants aux Glycopeptides (ERG)**
Diarrhées infectieuses (*ex Clostridium...*)
Infections cutanées (*ex Strepto A...*)

Gale
Zona

C+G

VRS - Strepto A
Diphtérie respiratoire
SARM respiratoire
Norovirus

Méningite bactérienne
Grippe saisonnière - Oreillons
Autres infections respiratoires excrétaNtes
Rubéole - Coqueluche

Gouttelette

C+A

SRAS - Coronavirus
Varicelle

Tuberculose pulmonaire
Rougeole

Air